

Рекомендации родителям, чьи дети подлежат вакцинации

Перед тем как начать делать прививки:

- посетите участкового педиатра;
- не менее чем за неделю до прививки перестаньте вводить новые виды пищи (актуально для детей с аллергией);
- посоветуйтесь с врачом педиатром о способе предотвращения и смягчения аллергических реакций на вакцину;

Требование о проведении иммунологического обследования ("иммунная карта крови") перед прививками, иногда выдвигаемое в средствах массовой информации, безосновательно и не имеет смысла, так как ни один из параметров так называемого иммунологического статуса (что часто необоснованно называют "вторичный иммунодефицит") не свидетельствует о повышенном риске осложнений. Анализ на первичный иммунодефицит потребовал бы проведения более 80 анализов, часто малонадежных.

Проверка наличия специфических антител перед прививкой грудных детей не имеет смысла, поскольку у них могут еще циркулировать материнские антитела, исчезающие в течение короткого срока.

- следует избегать приема антибиотиков и сульфаниламидов за 1-2 дня до вакцинации живыми вакцинами.

Подготовка к прививкам

- начните давать ребенку профилактический препарат, **если он назначен врачом;**

- узнайте у своего врача, через какое время после прививки можно ожидать каких-либо побочных реакций (и какие они).

Непосредственно перед прививкой

- ребенка должен осмотреть врач, измерить температуру;
- Вы имеете право ознакомиться с инструкцией к вакцине и проверить срок годности препарата

После прививки:

- проведите 20-30 минут после прививки в помещении поликлиники - это позволит Вам контролировать состояние ребенка после прививки и получить квалифицированную медицинскую помощь при необходимости;
- **по назначению врача** дайте ребенку профилактический препарат;
- если поднялась температура, то давайте ребенку больше пить
- **Недопустимо самостоятельно накладывать компрессы и мази на место укола!**

При проведении профилактических прививок детям первого года жизни должно быть обеспечено активное медицинское наблюдение (патронаж) в следующие сроки:

- на следующий день после иммунизации против гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции;
- на 2-й и 7-й дни после иммунизации против полиомиелита;
- через 1,3,6,9 и 12 мес. после иммунизации против туберкулеза.
- За детьми, получившими прививки против кори, краснухи и паротита (вакцинацию или ревакцинацию) должно быть проведено наблюдение на 5-7 день после прививки.